

حملة التطعيم المدرسي ضد الإنفلونزا 25-26



**GOBIERNO
DE ARAGON**

تطعيم الأنفلونزا لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث من مرحلة التعليم المبكر (3، 4 و 5 سنوات)

أعزائي أولياء الأمور:

نتوجه إليكم لإبلاغكم بأن مدرسة طفلكم ستشارك في الحملة المدرسية للتطعيم ضد الأنفلونزا. وتستهدف هذه المبادرة تلاميذ الصفوف الأول والثاني والثالث من مرحلة التعليم المبكر، أي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات.

الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو تعزيز حماية الأطفال ضد الأنفلونزا والمساهمة في تحسين الصحة العامة في مجتمعنا.




لماذا يجب تطعيم الأطفال الصغار ضد الأنفلونزا؟

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات هم الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة نتيجة الأنفلونزا، حتى في غياب أي مشاكل صحية سابقة.

التطعيم يقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بمرض حاد.

عادةً ما يكون الأطفال الصغار هم المصدر الرئيسي لانتشار الأنفلونزا في المجتمع، نظرًا لامتلاكهم حملاً فيروسيًا مرتفعًا.

يساهم تطعيمهم في كسر سلسلة انتقال العدوى، حيث لا يحميهم فقط، بل يحمي أسرهم والأشخاص الآخرين.



فوائد التطعيم المدرسي

بالإضافة إلى حماية الأطفال من الأنفلونزا، فإن حملة التطعيم هذه في المدارس تحمل فوائد أخرى هامة:

- تيسير الوصول إلى التطعيم: يتم تجنب الحاجة إلى الذهاب إلى المركز الصحي.
- تقليل الغياب عن المدرسة: اللقاح يقلل من عدد أيام التغيب الدراسي.
- تحسين التوازن الأسري: يتم تقليل عدد الأيام التي يجب أن يبقى فيها الأطفال في المنزل بسبب المرض، مما يسهل تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية.



كيف تصف رائحة اللقاح؟


سيتم إعطاء الأطفال اللقاح عبر الأنف، باستخدام رذاذ خفيف للغاية، مما يجعله إجراءً غير مؤلم تمامًا وآمنًا.


يمكن تقليل الدخول إلى المستشفى بسبب الأنفلونزا لدى الأطفال.

الأنفلونزا ليست دائمًا بسيطة، فقد تؤدي بك إلى المستشفى!

دخول المستشفى لعلاج الإنفلونزا لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا

الأطفال دون سن 5 سنوات
من 5 إلى 15 سنة





من لا يستطيع استخدام هذا اللقاح؟

- إذا كان لدى الطفل أي موانع للتطعيمات:
- حساسية شديدة (الحساسية المفرطة) تجاه البيض أو بروتيناته.
- النقص الحاد في جهاز المناعة أو نتيجة للعلاج الطبي.
- العلاج المزمّن باستخدام الساليسيلات (سواء عن طريق الفم أو الكريم).
- أعراض الربو خلال ثلاثة أيام قبل التطعيم.

إذا كنت غير متأكد، يُفضل استشارة طبيب الأطفال أو الممرضين في المركز الصحي الذي تتبعه.